

Zpracoval: RNDr. Hana Štambergová

Laboratorní příručka

LKB – EUC Laboratoře Pardubice s.r.o.

Platnost od: 9.6.2026

Laboratorní příručka

Laboratoř klinické biochemie – LKB - EUC Laboratoře Pardubice s.r.o.

Předmluva

Vážení přátelé,

na těchto stránkách se můžete seznámit s laboratorní příručkou určenou všem klientům, kteří využívají služeb laboratoře a hledají základní informace o našem oddělení. Ve stručnosti popisuje jednotlivé části procesů, obsahuje základní pokyny týkající se správného odběru biologického materiálu, přípravy pacienta k odběru a řadu dalších informací, které mohou zkvalitnit spolupráci mezi ambulancí a laboratoří.

Laboratorní příručka je vydána jako základní dokument zabezpečování kvality a je členěna podle požadavků ČSN ISO 15189.

Pro zajištění kvality a spolehlivosti poskytovaných služeb se laboratoř účastní externího hodnocení kvality a dále se řídí platnou legislativou a doporučeními odborných společností.

Laboratoř je akreditována podle normy 15189 (Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost).

Zpracoval:	5.6. 2026	RNDr. Hana Štambergová
Přezkoumal:	5.6. 2026	Ludmila Kučerová
Schválil:	8.6. 2026	RNDr. Hana Štambergová

Obsah

Předmluva.....	1
Identifikace laboratoře a důležité údaje	4
Základní informace o laboratoři.....	4
Spektrum nabízených služeb	4
Vyšetření pro veterinární účely.....	5
Pracovní režim.....	5
Preanalytická fáze.....	5
Zařízení pro odběry	5
Odběry primárních vzorků.....	5
Žádanky na vyšetření	5
Telefonické požadavky na vyšetření	5
Odběr vzorku – stručné pokyny.....	6
Příprava pacienta.....	6
Jednorázový vzorek moče	6
Celkový sběr moče	6
Hamburgerův sediment	7
Označení vzorku	7
Množství vzorku	7
Operace se vzorkem.....	7
Likvidace biologického odpadu	8
Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky.....	8
Příjem pacientů a identifikace vzorků.....	8
Transport vzorků	9
Ochrana osobních údajů	9
Seznam prováděných vyšetření na LKB	10
Statimová vyšetření	11
Samoplátci.....	12
Postanalytická fáze	12
Vydávání výsledků.....	12
Telefonování výsledků	12
Hlášení výsledků a předávání výsledkových listů pacientům.....	12
Výsledky v kritických intervalech	13

Změny a opravy výsledků.....	14
Konzultační činnost	14
Řešení stížností	14
Abecední seznam vyšetření	15
Krevní obraz z analyzátoru	27
Další pokyny a upozornění	38
Bezpečnostní aspekty	40
Zbytková rizika	40
Použité zkratky	43

Identifikace laboratoře a důležité údaje

Název organizace	EUC Laboratoře Pardubice s.r.o
Identifikační údaje	IČO 60917415 DIČ CZ699002423
Název laboratoře	Laboratoř klinické biochemie - LKB
Vedoucí laboratoře	RNDr. Hana Štambergová
Lékařský garant	MUDr. Libuše Mačátová
Vrchní laborantka	Ludmila Kučerová

Laboratoř LKB je umístěna v budově EUC Kliniky, ul. K. Šípka 282, Pardubice v přízemí společně s odběrovým místem (OM), které je ale organizačně začleněno pod Centrální odběrová místa EUC Praha.

Základní informace o laboratoři

Provozní doba	pondělí – pátek 6.30 – 14.00 hod.
Telefonní číslo	464 600 467-8

Laboratoř provádí základní biochemická, imunochemická a hematologická vyšetření biologického materiálu. Laboratoř je vybavena automatickými analyzátory a počítači s laboratorním informačním systémem (LIS), které jsou pravidelně kontrolovány proškolenými technikami.

Spektrum nabízených služeb

Laboratoř provádí

- vyšetření na žádost ošetřujícího lékaře
- vyšetření na žádost pacienta – náklady si hradí pacient (samoplátce), nabídka laboratorních vyšetření a ceník pro samoplátce viz webové stránky - www.euc.cz, www.euclaboratore.cz
- základní biochemická a imunochemická vyšetření – krev, moč
- základní hematologická a koagulační vyšetření
- statimová vyšetření
- služby spojené s laboratorním vyšetřením – příjem materiálu, přeposílání materiálu do smluvních laboratoří, distribuce výsledků
- vyšetření pro veterinární účely
- možnost nastavení e-žádanek
- doručení výsledkových listů
- bezpečný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému – poskytování výsledků podle přání lékaře – v písemné nebo elektronické podobě do karty pacienta

Pokud některé vyšetření laboratoř neprovádí, zajišťuje odeslání vzorku do smluvní laboratoře.

Výsledky rutinních biochemických a hematologických vyšetření jsou k dispozici následující den, statimové výsledky jsou sděleny telefonicky či elektronicky ihned po změření nejpozději do dvou hodin od dodání do laboratoře.

Vyšetření pro veterinární účely

Dopravení biologického materiálu do laboratoře je záležitostí veterinárního lékaře. Ceny vyšetření vycházejí z aktuálního Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Hodnota bodu je určena 1,21 Kč/bod včetně DPH, fakturace se provádí 1 x měsíčně. Laboratoř zajišťuje na vyžádání zasílání aktuálních bodových hodnot výkonů.

Pracovní režim

6.30 – 13.30 hod.	pondělí–pátek – příjem vzorků
6.30 – 14.30 hod.	pondělí–pátek – provádění analýz, tisk a kompletace výsledků

Preanalytická fáze

Zařízení pro odběry

Laboratoř zpracovává biologický materiál odebraný v odběrových místech nebo v ambulanci lékařů.

Odběry primárních vzorků

Veškeré informace o odběru krve a moče uvedené v této příručce slouží jako základní orientace klientům laboratoře.

Žádanky na vyšetření

Laboratoř přijímá všechny typy žádanek (vč. e-žádanek), které obsahují tyto povinné informace:

- identifikace pacienta – RČ (u cizinců číslo smlouvy), jméno a příjmení, datum narození, pohlaví
- diagnóza
- kód pojišťovny, případně označení samoplátce
- razítko a podpis lékaře s identifikací objednatele (adresa, telefonní číslo), **neplatí pro samoplátce**
- čitelně a jednoznačně požadovaná vyšetření, druh primárního vzorku
- datum a čas odběru
- identifikace osoby provádějící odběr
- další údaje potřebné pro vydání výsledků – (objem moče, výška, váha pacienta)
- u požadavků na urgentní stanovení výrazné označení „statim“

Žádanka se archivuje po dobu pěti let.

Telefonické požadavky na vyšetření

Ze vzorků lze dodatečně, např. na základě telefonického objednání, provádět další vyšetření. Tato vyšetření lze provést s ohledem na stabilitu analytu v biologickém materiálu, nejdéle do týdne po odběru, tj. doby, kdy jsou vzorky krve v laboratoři skladované. Doobjednané analýzy vyžadují vypsání nové žádanky. Vzorky na hematologické a koagulační testy (tzn. nesrážlivé krve) a vzorky moče se likvidují na konci pracovního dne.

Odběr vzorku – stručné pokyny**Příprava pacienta**

Pacient má být vždy informován, jaká opatření před odběrem má dodržovat a co hlásit sestře.

Příprava pacienta pro plánovaná a kontrolní vyšetření ze vzorku venózní krve

Při plánovaném odběru se pacient dostaví po patřičném lačnění (cca 10 až 12 hodin) a době fyzického klidu. Den před odběrem by měl vynechat tučná jídla, všechny léky, které nejsou naprosto nezbytné, a těsně před odběrem by neměl kouřit, pít kávu nebo požívat alkoholické nápoje. Ráno před odběrem je vhodné vypít zhruba $\frac{1}{4}$ l hořkého čaje (neslazeného nápoje). V případě, že je pacient alergický na dezinfekční prostředky, určitý typ náplastí nebo mu bývá při odběru krve nevolno, měl by informovat odběrovou sestru. Při funkčních a zátěžových testech je nutné dodržovat přesně pokyny personálu.

Příprava pacienta pro plánovaná a kontrolní vyšetření ze vzorku moče

Pacient je poučen o zásadách správného odběru jednorázového vzorku nebo sbírání moče.

Odběr žilní krve

Odběr žilní krve provádíme většinou dopoledne, obvykle nalačno. Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se vpich a teprve potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová zkumavka nesmí být nasazena na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Je-li ve vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převrácením.

Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu:

1. zkumavky s přísadami (natrium citrát) – koagulace, sedimentace krve
2. zkumavky pro separaci séra (bez přísad nebo s aktivátorem srážení)
3. ostatní zkumavky – EDTA, fluorid sodný/EDTA

Jednorázový vzorek moče

Nejlépe vyhovuje první ranní vzorek moče. Po hygienické očištění pacient odebere do čisté suché nádoby alespoň 10 ml středního proudu moče. Interval od vymočení do vyšetření vzorku má být dle možností do 2 hodin. Delší stání materiálu vede k možnosti ovlivnění výsledku jak chemického, tak morfologického vyšetření.

Celkový sběr moče

Moč se sbírá nejčastěji 24 hodin, na některá vyšetření stačí sběr kratší 6 nebo 12 hodin. Pacient se před zahájením sběru vymočí do WC, pak začne sbírat už do sběrné nádoby. V některých případech je nutno přidat i konzervační činidlo (pro stanovení kyseliny vanilmandlové, 5 – OH indolactové – 10 ml 25 % HCl). Po uběhnutí požadovaného časového intervalu 6, 12 nebo 24 hodin se pacient naposledy vymočí do sběrné nádoby, změří množství, promíchá

a odlije vzorek. Nemá-li možnost změření množství, přinese vše do laboratoře. Přesné pokyny ke sběru moče, popř. konzervační činidla obdrží pacient v laboratoři nebo v ordinaci lékaře.

Hamburgerův sediment

Kvantitativní morfologická analýza močového sedimentu. Pacient sbírá moč 3 hodiny od posledního močení do WC s maximální odchylkou ± 30 minut. Dobu sběru je nutné uvést s přesností na minuty. Všechnu moč z tříhodinového sběru donese v označené nádobce nejlépe do 2 hod. do laboratoře.

Označení vzorku

Nádobky s biologickým materiálem musí být označeny jménem a rodným číslem pacienta, kultivační vzorky musí navíc obsahovat informaci o druhu materiálu.

Množství vzorku

Množství plné krve, které je potřeba odebrat, záleží na druhu a počtu požadovaných vyšetření. V současné době je na OM i v ambulancích používán vakuový odběr, kde jsou objemy odebrané krve definovány vakuem ve zkumavce.

Doporučené množství plné krve:

Klinická biochemie	pro 20-25 stanovení 4–5 ml krve
Imunochemické a speciální metody	1 ml krve pro 2 stanovení
Krevní skupina, HLA antigeny	zkumavka s K2EDTA po rysku
Hematologie	zkumavka s K3EDTA po rysku
Koagulace	zkumavka s citrátem po rysku
Sedimentace krve	zkumavka s citrátem po rysku
Moč ranní, sběr	10 ml moče

U zkumavek s jakoukoli protisrážlivou složkou je pro správnou analýzu nutné dodržet objem odebrané krve.

Operace se vzorkem

Odebrané vzorky musí být uchovávány stranou od zdroje tepla a přímého světla. Chybou jsou větší teplotní výkyvy před i během transportu. Pokud je vzorek transportován do laboratoře, musí být co nejdříve doručen společně se žádankou ke zpracování, tak aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu analýz. Plazma nebo sérum mají být odděleny co nejdříve od odběru (u srážlivé krve po 30 minutách) - viz tabulka str. 10. U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, krev na stanovení teplotně nestabilních analytů je nutné po odběru chladit. Po oddělení krevního koláče od séra je možné vzorek uchovávat v lednici při teplotě 2-8°C. Při používání odběrových zkumavek se separačními gely nelze opakovat centrifugaci, protože by se smísilo sérum pod gelem (které bylo v kontaktu s krevními elementy) se sérem nad gelem. Skladování je možné týden bez kontaminace séra celulárními komponentami. Při nedodržení preanalytické fáze mohou být některé výsledky ovlivněny. Na tuto situaci laboratoř upozorňuje na výsledkovém protokolu.

Hemolýza ovlivňuje některá biochemická i hematologická vyšetření, zejména proto, že řada látek přejde z erytrocytů do séra nebo plazmy, nebo že zbarvení interferuje s vyšetřovacím postupem. Hemolýzu může způsobit kontaminace jehly nebo pokožky stopami dezinfekčního roztoku, použití příliš úzké jehly, prudké třepání krve, nedodržení doby srážení nebo velká změna teplot např. při přepravě vzorku

Přeprava materiálu musí být provedena rychle, při teplotě 15–25°C. Vzorky krve jsou do laboratoře přepravovány v transportních boxech s vloženými chladicími vložkami a teploměry pro monitorování teploty transportu.

Likvidace biologického odpadu

Biologický odpad je shromažďován v kontejnerech s příslušným číselným kódem a denně odnášen do sběrného místa v budově kliniky. Odvoz je zajišťován smluvní firmou. Veškerá práce s biologickým odpadem se řídí platnými zákony a vyhláškami.

Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

Obecné zásady bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou v platné verzi Vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Každý vzorek je nutné považovat za potencionálně infekční. Žádanka ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminována biologickým materiálem. Žádanka pacienta se zjištěným přenosným virovým onemocněním by měla být viditelně označena, na tuto skutečnost musí být upozorněni všichni, kteří přijdou s takovýmto vzorkem do kontaktu. Vzorky, které jsou odesílány do dalších laboratoří, musí být pečlivě uzavřeny a uloženy do přepravních stojánků tak, aby nedošlo k rozlití a znehodnocení vzorku.

Přijem pacientů a identifikace vzorků

Operace se vzorky před analýzou jsou standardizovány a prováděny podle vnitřních předpisů, které jsou k dispozici na pracovišti.

Postup při nesprávné identifikaci pacienta nebo vzorku

Před odběry prováděnými na OM EUC kontroluje správnost identifikačních údajů na žádance pracovník na příjmu vyžádáním kartičky zdravotní pojišťovny. Při nedostatečných, nečitelných nebo chybných údajích laboratoř telefonicky kontaktuje odesílající pracoviště k doplnění údajů hned během příjmu, aby nedošlo ke zbytečnému zpoždění zpracování vzorku.

U dovezených nedostatečně označených vzorků, které se nepodaří identifikovat ani po domluvě s odesílajícím lékařem nebo u chybně odebraných a znehodnocených vzorků není analýza provedena. Příslušné oddělení nebo ambulance je o odmítnutí vzorku telefonicky nebo písemně informováno. O chybných identifikacích a neprovedených analýzách je zakládán záznam do počítače.

Kritéria pro odmítnutí vadných primárních vzorků

Odmítnout lze

- žádanku, na které chybí základní údaje pojištěnce a razítko lékaře, který vyšetření požaduje
- žádanku nebo zkumavku znečištěnou biologickým materiálem
- materiál, který nesplňuje podmínky správného odběru – krev odebraná do nesprávné zkumavky, nedodržení poměru krve a protisrážlivého činidla (EDTA, citrát)
- vzorky biologického materiálu, kde není způsob identifikace z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný, neoznačené zkumavky
- biologický materiál bez žádanky

- nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení preanalytické fáze – upozornění na nedodržení preanalytické fáze je uvedeno ve výsledkovém protokolu
- žádanku ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůžkového oddělení

Transport vzorků

Doprava vzorků je zajišťována denně řidiči společnosti EUC Laboratoře s.r.o. Pro transport jsou používány přepravní boxy (označené biohazard) zamezující znehodnocení vzorků horkem nebo mrazem s monitorovanou teplotou.

Teplota transportu je 15 - 25° C. Řidiči jsou poučeni o způsobu a podmínkách pro správnou přepravu vzorků. Zaměstnanci jsou o podmínkách transportu informováni jen v případě jeho nedodržení. Nedodržení podmínek transportu je evidováno zaměstnanci laboratoře.

Materiál je uložen ve stojácích, aby nedošlo k jeho znehodnocení nebo rozlití, odděleně od žádanek pro vyloučení možnosti jejich znečištění

Obdrží-li laboratoř požadavky na vyšetření, která sama neprovádí, jsou vzorky převáženy do smluvní laboratoře. Transport probíhá po 12. hodině denně, podle potřeby dvakrát. Pokud je nutné vzorek přepravovat při nižší teplotě, podmínky pro transport zajišťují zaměstnanci laboratoře.

Vzorky na histologii a mikrobiologii nejsou laboratoří evidovány, laboratoř pouze zprostředkuje jejich transport do smluvní laboratoře.

Za analýzu vzorků a dodání výsledků zodpovídá provádějící laboratoř.

Ochrana osobních údajů

Obecnou zásadou laboratoře je zajišťovat důvěrnost informací o předmětech a výsledcích vyšetření a údajích o pacientech vč. ochrany při dodávání výsledků vyšetření.

K naplnění této politiky jsou v laboratoři přijaty následující postupy:

- 1) Prostory laboratoře, ve kterých se mohou nalézat informace o pacientech, nejsou cizím osobám volně přístupné
- 2) Počítače jsou umístěny v prostorách laboratoře. Přístup k záznamům je omezen na určené osoby – přístup na uživatelské jméno a heslo.
- 3) Ochrana utajovaných informací – informace o pacientech (vyplněné v žádankách) jsou uloženy v počítačích, kam mají přístup jen určené osoby. Papírové žádanky jsou ukládány v prostorách laboratoře s řízeným přístupem.
- 4) Telefonické hlášení výsledků lékaři i pacientovi je možné jen na základě sdělení předem domluveného číselného kódu
- 5) Všichni pracovníci laboratoře včetně externích (servisní technici, svozoví řidiči, uklízečky apod.) podepsali prohlášení o mlčenlivosti a zachování důvěrných informací
- 6) Ukládání, archivace a skartace dokumentů probíhá v souladu s příslušnou dokumentací.
- 7) Používání LIMS na odběrových místech Vektor v Pardubicích a na EUC Klinikách v Hradci Králové a Přelouči je omezeno pouze na načítání e-žádanek. V případě papírových žádanek sestra zapíše základní identifikaci pacienta a zadá identifikační štítky pro označení odebraného materiálu. K dalšímu užívání LIMS nemají sestry oprávnění. Úplný příjem je proveden v laboratoři.

Seznam prováděných vyšetření na LKB

Biochemie

analyt	materiál	dostupnost	statim	poznámka
Albumin	sérum, moč	rutinní-denně	ne	plazma není vhodná
ALP	sérum	rutinní-denně	ano	v séru stabilní při pokoj.teplotě 4 hod.,
ALT	sérum	rutinní-denně	ano	zabránit hemolýze
AMS	sérum, moč	rutinní-denně	ano	zabránit hemolýze
AST	sérum	rutinní-denně	ano	zabránit hemolýze
Bilirubin celkový	sérum	rutinní-denně	ano	chránit před světlem, zabránit hemolýze
Bilirubin přímý	sérum	rutinní-denně	ano	chránit před světlem, zabránit hemolýze
Ca /vápník/	sérum, moč	rutinní-denně	ano	při odběru nesrážlivé krve rychle separovat
Celková bílkovina	sérum	rutinní-denně	ne	
CK	sérum	rutinní-denně	ano	při odběru nesráž. krve separovat do 30 min. zabránit tělesné námaze před odběrem, neodebírat po chirurgických výkonech
Cl /chloridy/	sérum, moč	rutinní-denně	ano	
CRP	sérum	rutinní-denně	ano	
D-dimery	plazma	rutinní-denně	ano	
Fe /železo/	sérum	rutinní-denně	ne	ranní odběr, zabránit hemolýze, separovat do 1 hod.
Glukóza	sérum, moč	rutinní-denně	ano	centrifugovat nejpozději do 1 hod po odběru, v NaF do 5 hod.
Glyk. hemoglobin	plná krev	utinní - denně	ne	odběr do K3EDTA
GGT	sérum	rutinní-denně	ano	zabránit hemolýze
HDL cholesterol	sérum	rutinní-denně	ne	
Cholesterol	sérum	rutinní-denně	ne	v plazmě při pokoj. teplotě stabilní 3 hod, urychleně centrifugovat
K /draslík/	sérum, moč	rutinní-denně	ano	v plné krvi nestabilní, zabránit hemolýze, separovat nejpozději do 4 hod. po odběru
Kreatinin	sérum, moč	rutinní-denně	ano	
Kyselina močová	sérum	rutinní-denně	ano	
LDL cholesterol	sérum	rutinní-denně	ne	
Mg /hořčík/				separace do 30 min. po odběru, zabránit hemolýze
Moč + sediment	moč	rutinní-denně	ano	dopřít do laboratoře do 2 hod.
Moč – Hamburger	moč	rutinní-denně	ne	dopřít do laboratoře do 2 hod.

Na /sodík/	sérum, moč	rutinní-denně	ano	stabilita v plazmě 1 hod. centrifugovat 30 min. po odběru
P /fosfor/				separace do 30 min. po odběru
PSA	sérum	rutinní-denně	ne	stabilita vzorku 3 hod. od odběru při pokoj. teplotě
PSA volný /fPSA/	sérum	rutinní denně	ne	stabilita vzorku 3 hod. od odběru při pokoj. teplotě
Troponin T	sérum	rutinní-denně	ano	zabránit hemolýze
Triglyceridy	sérum	rutinní-denně	ne	
Tyreotropin /TSH/	sérum	rutinní-denně	ne	
T4 volný /fT4/	sérum	rutinní-denně	ne	centrifugovat do 6 hod. po odběru
Urea	sérum	rutinní-denně	ano	
Krevní obraz+diff	plná krev	rutinní-denně	ano	stabilita vzorku 5 hod. od odběru
Diferenciál mikroskop.	plná krev	rutinní-denně	ne	při patologii. přístrojového diferenciálu
Retikulocyty	plná krev	rutinní-denně	ne	pouze u KO statim, jinak export do centr. laboratoře
APTT	plazma	rutinní-denně	ano	stabilita 4 hod. po odběru
Quick /PT/	plazma	rutinní-denně	ano	stabilita 6 hod. po odběru
Krvácivost	plná krev	rutinní-denně	ne	pouze na OM, výsledek do 10 min.

Při stanovení biochemických parametrů je upřednostňováno sérum, u některých lze použít i plazmu – především heparinát lithný (o možnosti použití různých antikoagulancií se můžete informovat v laboratoři).

Hematologie a koagulace

Všechny přístroje a zařízení jsou pravidelně kontrolovány. K analyzátorům jsou přiloženy aktuální verifikační protokoly o způsobilosti přístroje k měření. Verifikační protokoly vydávají servisní technici, kteří mají oprávnění provádět servis konkrétního analyzátoru. Lednice určené pro skladování diagnostických souprav, kalibrátorů, kontrol, biologického materiálu jsou vybaveny max-minimálními teploměry. Používaná měřidla (teploměry, budíky) jsou pravidelně kontrolována, aby nedošlo ke zkreslení naměřených údajů.

Správnost měřených parametrů je denně kontrolována. Laboratoř má vypracovaný systém vnitřní kontroly kvality, mimo to se pravidelně účastní externího hodnocení kvality (EHK).

Nejistoty měření jednotlivých metod jsou v laboratoři k dispozici na vyžádání.

Statimová vyšetření

Laboratoř provádí statimová vyšetření. Požadavek na statim musí být na žádance jasně uveden. Takto označené vzorky jsou vyšetřeny nejpozději do 2 hodin od doručení vzorku do laboratoře a výsledky dle požadavku lékaře odeslány elektronicky nebo telefonicky nahlášeny.

Samoplátci

Samoplátce je klient laboratoře, který požaduje laboratorní vyšetření bez ordinace lékaře, nebo požadované vyšetření není hrazeno pojišťovnou. Samoplátce hradí příslušnou částku před odběrem. Cena za vyšetření je stanovena v „Ceníku služeb laboratoří EUC pro samoplátce“ (dohledatelné také na webových stránkách EUC). Výsledky samoplátců jsou posílány elektronicky po uvedení telefonního čísla a e-mailové adresy nebo jsou připraveny k osobnímu vyzvednutí.

Postanalytická fáze

Vydávání výsledků

Laboratorní výsledky se běžně vydávají v tištěné a elektronické podobě. Výsledek obsahuje:

- název laboratoře, která výsledek vydala
- identifikaci pacienta (v pořadí - IČ resp. rodné číslo, příjmení, jméno, kód pojišťovny a diagnóza)
- název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření
- datum a čas příjmu a odběru krve
- název vyšetření s jednotkami měření a s referenčními intervaly (pokud se uvádějí)
- typ primárního vzorku
- datum a čas tisku výsledku
- další poznámky (texty ke kvalitě vzorku nebo odběru atd.)
- identifikace osoby, která výsledky kontroluje k uvolnění
- informace o akreditaci
- informaci o odeslání vzorku do smluvních laboratoří
- kódy výkonů a jejich četnost

Předávání výsledků v elektronické podobě probíhá automaticky během dne po uvolnění výsledků laboratoří. Elektronický přenos výsledků je možné provést opakovaně. Tištěné výsledkové listy jsou lékařům předávány přímo nebo rozesílány poštou.

Telefonování výsledků

Telefonicky se hlásí statimy a výsledky spadající do kritických intervalů. Hlášení provádí úseková laborantka, která hlášení zaznamená do LISu. LIS automaticky zaznamená čas a jméno pracovníka, který zápis provedl. Informace o hlášení je součástí tiskového protokolu.

Pacientům se výsledky nesdělují. Výjimkou jsou glykémie u diabetiků, protrombinový čas (INR) u léčených pacientů a výsledky samoplátců. Pokud si bude pacient (v těchto uvedených případech) o výsledky telefonovat, je nutné předem informovat personál při odběru. Pacientovi je pak přidělen číselný kód, kterým se před nahlášením výsledků prokáže. Číselný kód je při každém dalším odběru jiný.

Lékař, který si telefonuje o výsledky, se musí nejprve identifikovat číslem dohodnutým s laboratoří a pak nahlásit RČ pacienta.

Hlášení výsledků a předávání výsledkových listů pacientům

Výsledkové listy jsou předávány pacientům, pokud jsou splněny tyto podmínky:

- na žádance je lékařem písemně uvedeno, že pacient si výsledkový list vyzvedne osobně
- jedná se o pacienta, který je často monitorován (Quick, glykémie), v tomto případě si pacient může sám o výsledek zatelefonovat (viz Telefonování výsledků)
- výsledek vyzvedává rodinný příslušník, který se prokáže průkazem totožnosti a potvrzenou plnou mocí
- ve všech případech je výsledek vydán na základě průkazu totožnosti
- samoplátcům je výsledek zasílán elektronicky do e-mailu, který lze otevřít na základě kódu poslaného do mobilního telefonu

Výsledky v kritických intervalech

Výrazně patologické výsledky (výsledky v kritických hodnotách) jsou hlášeny lékařům. Kritické hodnoty jsou nastaveny podle požadavků lékařů nebo vychází z doporučení odborných společností.

Hematologická vyšetření

Vyšetření	Děti** dospělí pod	Děti** a dospělí nad	Jednotka
Hemoglobin	90 70/ 80*	200	g/l
Leukocyty	2/ 2,5*	20	10 ⁹ /l
Trombocyty	50	1000/ 800*	10 ⁹ /l
Quickův test		INR nad 5,0	
APTT		poměr nad 2,0	

Biochemická vyšetření – sérum

Vyšetření	Děti** a dospělí pod	Děti** dospělí nad	Jednotka
Urea		12 30/ 20*	mmol/l
Kreatinin		150 300/ 250*	μmol/l
Natrium	125	155	mmol/l
Kalium	2,5	6,2	mmol/l
Chloridy	85	125	mmol/l
Bilirubin		100	μmol/l
ALT		3,0* 7,0*	μkat/l
AST		5,0*	μkat/l
AMS		10,0*	μkat/l
U-AMS		20,0*	μkat/l
CK		20,0	μkat/l
CRP		50 100	mg/l
D-dimery		4	mg/l FEU
Glukóza	2,5	10,0 20,0/ 15,0*	mmol/l
GGT		10*	μkat/l
Troponin T		14	ng/l
Tyretropin		50* 100*	mU/l

* při prvním záchytu

** děti do 17 let

Změny a opravy výsledků

Opravou výsledků a nálezů se rozumí změna údajů na výsledkovém listu, který byl již odeslán. Opravu schvaluje vedoucí oddělení nebo pověřený pracovník a provádí pracovník s příslušnými přístupovými právy. Změnu telefonicky nahlásí příslušnému lékaři a současně odešle opravený výsledkový list, který je v záhlaví jasně označen jako „Přepracovaný protokol“. O změně provede písemný záznam.

Konzultační činnost

Konzultační činnost je určena jak pro lékaře, tak laickou veřejnost. Vysokoškolští pracovníci laboratoře poskytují konzultační činnost telefonicky, nebo elektronickou korespondencí. Laborantky podávají informace týkající se běžného provozu pracoviště, o prováděných metodách, cenách vyšetření apod.

Řešení stížností

Drobné připomínky k práci laboratoře jsou řešeny průběžně pracovníkem, který stížnost přijal, je-li to v jeho kompetenci. Stížnosti tohoto charakteru se neevidují. Závažnější stížnosti, které lze řešit ihned, vyřeší pracovník, který stížnost přijal a informuje o jejím řešení vedoucího oddělení. Písemnou stížnost řeší vždy vedoucí oddělení ve lhůtě 14 dnů. Písemné stížnosti podléhají evidenci.

Abecední seznam vyšetření

Albumin v moči (mikroalbuminurie - MAU)

Odběrový systém	čistá nádobka, zkumavka na moč (se žlutým uzávěrem)
Materiál	moč
Stabilita	20 -25° C - 24 hod., 4-8°C 4 týdny
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí - pátek
Výsledek	v den doručení (odpoledne)
Jednotky	mg/l, v příp. přepočtu na kreatinin - ACR - g/mol
Referenční meze	< 10 mg/l, ACR muži < 2,5 g/mol ženy < 3,5 g/mol

Pokyny k odběru noční sběr se nahrazuje prvním ranním vzorkem moči, kdy výsledkem je koncentrace albuminu v mg/l, přepočítaná na koncentraci kreatininu - ACR.

Účel vyšetření důkaz přítomnosti selektivní glomerulární filtrace, typický nález u diabetické a hypertenzní nefropatie

Albumin

Odběrový systém	zkumavka s aktivátorem srážení
Materiál	krev – sérum, plazma není vhodná
Stabilita	20 -25° C - 7 dní, 4-8°C - 1 měsíc
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek
Výsledek	v den doručení (odpoledne)
Jednotky	g/l
Referenční meze	0 – 6 T 27 – 33 g/l 6 T - 1 R 30 - 43 g/l 1 R - dospělí 35 – 52 g/l

Pokyny k odběru koncentrace je závislá na poloze při odběru, rozdíl vleže a vsedě je cca 10 %, ze stejných důvodů je delší použití manžety a cvičení před odběrem nevhodné. Lipémie zkresluje výsledky.

Účel vyšetření diagnostika onemocnění jater, deficitu bílkovin, poruch ledvin, gastrointestinálních a nádorových onemocnění

Aktivovaný parciální tromboplastinový čas /viz APTT/

Alaninaminotransferáza /viz ALT/

ALP - Alkalická fosfatáza

Odběrový systém	zkumavka s aktivátorem srážení
Materiál	krev
Stabilita	sérum: 20-25°C - 4 hod, 4-8°C – 3 dny plazma: 20-25°C - 2 dny , 4-8°C – 3 dny

Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí–pátek	
Výsledek	v den doručení (odpoledne)	
Jednotky	μkat/l	
Referenční meze	6 T – 1 R	1,40 – 8,00 μkat/l
	1 R – 10 R	1,12 – 6,20 μkat/l
	10 R – 15 R	1,35 – 7,50 μkat/l
	muži >15 R	0,67 – 2,15 μkat/l
	ženy > 15 R	0,58 – 1,74 μkat/l
Pokyny k odběru	odběr je nutné provádět nalačno, po jídle stoupá koncentrace střevního izoenzymu, platí zejména pro krevní skupiny A a 0	
Účel vyšetření	detekce a identifikace onemocnění skeletu charakterizované významnou aktivitou osteoblastů a chondroblastů, detekce jaterních lézí zapříčiňující biliární obstrukci, odpověď na podávání vitamínu D při léčbě rachitidy, doplnění informací získaných jinými jaterními testy, diagnostika nádorových onemocnění s metastázami, sledování funkce placenty ve 3. trimestru rizikového těhotenství	

ALT (alaninaminotransferáza)

Odběrový systém	zkumavka s aktivátorem srážení	
Materiál	krev	
Stabilita	sérum:	20 -25°C – 2 dny, 4-8°C – 5 dnů
	plazma:	20 -25°C – 2 dny, 4-8°C – 5 dnů
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim	
Výsledek	v den doručení (odpoledne)	
Jednotky	μkat/l	
Referenční meze	6 T – 1 R	0,05 – 0,85 μkat/l
	1 R – 15 R	0,05 – 0,60 μkat/l
	muži >15 R	0,17 – 0,83 μkat/l
	ženy >15 R	0,17 – 0,58 μkat/l
Pokyny k odběru	před odběrem vynechat svalovou námahu, zabránit hemolýze, také lipémie zkresluje výsledky	
Účel vyšetření	akutní choroby jater (hepatitida, cirhóza, toxické poškození jater) a hodnocení jejich léčby, rozlišení mezi poškozením jater a myokardu	

AMS (amyláza)**Moč**

Odběrový systém	čistá nádobka, zkumavka na moč	
Materiál	moč	
Stabilita	20 -25°C -7 dnů, 4-8°C – 8 týdnů	
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim	
Výsledek	v den doručení (odpoledne)	
Jednotky	μkat/l	
Referenční meze	muži	0,27 – 8,20 μkat/l
	ženy	0,35 – 7,46 μkat/l

Pokyny k odběru nádoby musí být bez konzervačních přísad

Účel vyšetření diagnostika akutní pankreatitidy, diagnostika chronické pankreatitidy a chorob slinných žláz, podezření na extrapancreatický původ zvýšených aktivit amyláz –kardiochirurgické výkony, anorexie, alkoholismus, choroby plic, cystadenokarcinom vaječníku

Sérum

Odběrový systém zkumavka s akcelerátorem srážení

Materiál krev

Stabilita sérum, plazma: 20 -25°C – 7 dnů, 4-8°C – 8 týdnů

Dostupnost rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim

Výsledek v den doručení (odpoledne)

Jednotky $\mu\text{kat/l}$

Referenční meze 0,47 – 1,67 $\mu\text{kat/l}$

Pokyny k odběru zabraňte jakékoli kontaminaci slinami nebo potem

Účel vyšetření diagnostika akutní pankreatitidy, rozlišení mezi akutní pankreatitidou a jinými bolestmi břicha, hodnocení poškození pankreatu, diagnostika epidemické a alkoholové parotitidy

APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový čas)

Odběrový systém zkumavka s citrátem sodným 1 +9 (citrát+krev)

Materiál krev

Stabilita 20 -25°C – 4 hod., při heparinové léčbě pouze 1 hod; stabilita se týká získané plazmy

Dostupnost rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim

Výsledek v den doručení

Jednotky výsledek – poměr času vzorku a normální kontroly

Referenční meze poměr 0,80 – 1,20

Pokyny k odběru odebírat zásadně do plastových zkumavek, sklo aktivuje koagulaci. Maximální stabilita u heparinizovaných krví je 1 hodina, do té doby musí být vzorek centrifugován. Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Koagulační zkumavky jsou opatřeny ryskou určující správný objem krve. Hemolytické vzorky (prokoagulační efekt) a lipémie může zkreslit výsledky.

Účel vyšetření monitorování léčby heparinem, screening vrozených/ získaných deficitů koagulačních faktorů VIII, IX, XI, XII, prekalkreinu a vysokomolekulárního kininogenu, screening inhibitorů faktorů VIII, IX, XI, diagnostika diseminované intravaskulární koagulace, diferenciální diagnostika trombotických komplikací, screening na detekci lupusového inhibitoru

AST (aspartátaminotransferáza)

Odběrový systém zkumavka s akcelerátorem srážení

Materiál krev

Stabilita sérum: 20 -25°C –3 dny, 4-8°C – 5 dnů
plazma: 20 -25°C – 3 dny, 4-8°C – 5 dnů

Dostupnost rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim

Výsledek v den doručení (odpoledne)

Jednotky $\mu\text{kat/l}$

Referenční meze	6 T - 1 R	0,27 – 0,97 μ kat/l
	1 R – 15 R	0,10 – 0,63 μ kat/l
	muži nad 15 R	0,17 – 0,85 μ kat/l
	ženy nad 15 R	0,17 – 0,60 μ kat/l
Pokyny k odběru	vadí větší fyzická námaha 24 hodin před odběrem, hemolýza zvyšuje výsledky	
Účel vyšetření	detekce a diferenciální diagnostika akutních chorob jater, monitorování progresu a prognózy při onemocnění srdce a jater, diagnostika infarktu myokardu, diagnostika myopatií	

Bilirubin celkový

Odběrový systém	zkumavka s akcelerátorem srážení	
Materiál	krev	
Stabilita	sérum:	20 -25°C – 5 hodin, chránit před světlem, 4-8°C – 3 dny
	plazma:	20 -25°C – 2 dny, 4-8°C – 7 dnů
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim	
Výsledek	v den doručení (odpoledne)	
Jednotky	μ mol/l	
Referenční meze	0–1 R	0 – 29 μ mol/l
	dospělí	2– 21 μ mol/l
Pokyny k odběru	zabránit hemolýze a působení světla – snížení hodnot	
Účel vyšetření	hodnocení hepatobiliární a erytropoetické funkce, diferenciální diagnostika ikteru a monitorování jeho stavu, diagnostika biliární obstrukce a hemolytické anémie	

Bilirubin konjugovaný (přímý)

Odběrový systém	zkumavka s akcelerátorem srážení	
Materiál	krev	
Stabilita	sérum:	20 -25°C – 5 hod., 4-8°C – 3 dny
	plazma:	20 -25°C – 24 hod., 4-8°C – 5 dnů
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim	
Výsledek	v den doručení (odpoledne)	
Jednotky	μ mol/l	
Referenční meze	dospělí <5,1 μ mol/l	
Pokyny k odběru	zabránit hemolýze a působení světla – snížení koncentrace	
Účel vyšetření	hodnocení hepatobiliární a erytropoetické funkce	

Ca (Vápník)**Moč**

Odběrový systém	čistá nádobka, močová zkumavka	
Materiál	moč	
Stabilita	20-25°C – 6 hod., 4-8°C – 24 hod.	
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek	
Výsledek	v den doručení (odpoledne)	
Jednotky	mmol/l, odpad moči/24 hod. - mmol/24 h	

Referenční meze děti 1 – 15 R 2,0 – 4,0 mmol/24 h
 dospělí 2,4 – 7,2 mmol/24 h

Pokyny k odběru vhodné současné stanovení i kreatininu pro přepočet koncentrace

Účel vyšetření posouzení metabolismu vápníku a fosforu, monitorování léčby deficitu vápníku a fosfátů, diferenciální diagnostika metabolických osteopatií a osteoporózy, posouzení metabolismu Ca při některých klinických syndromech jako např. bolesti v kostech, renální insuficience, chronické průjmy, vyvolané menopauze

Sérum

Odběrový systém zkumavka s akcelerátorem srážení

Materiál krev

Stabilita sérum: 20-25°C – 8 hod., 4-8°C – 24 hod.
 plazma: 20-25°C – 8 hod., 4-8°C – 24 hod.

Dostupnost rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim

Výsledek v den doručení (odpoledne)

Jednotky mmol/l

Referenční meze <2 R 2,25 – 2,75 mmol/l
 2 R – 12 R 2,20 – 2,70 mmol/l
 12 R – 18 R 2,10 – 2,55 mmol/l
 18 R – 60 R 2,15 – 2,50 mmol/l
 60 R – 90 R 2,20 – 2,55 mmol/l
 nad 90 R 2,05 – 2,40 mmol/l

Pokyny k odběru vzhledem k vazbě Ca na proteiny je koncentrace závislá na poloze těla, rozdíl mezi odběrem vleže a vsedě je asi 10 %, z podobných důvodů je nutné při odběru zabránit nadměrnému zatažení paže manžetou, nesmí dojít ke kontaminaci cheláty (EDTA)

Účel vyšetření diagnostika nervosvalových, kosterních a endokrinních poruch, dysrytmií, patologie srážení krve, acidobazická nerovnováha

Celková bílkovina

Odběrový systém zkumavka s akcelerátorem srážení

Materiál: krev

Stabilita: 20°–25° C – 5 dnů, 4-8° C – 4 týdny
 plazma: 20 -25° C – 5 dnů, 4-8° C – 4 týdny

Dostupnost rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim

Výsledek v den doručení (odpoledne)

Jednotky g/l

Referenční meze 7 M – 1 R 51 – 73 g/l
 1 R – 15 R 58 – 80 g/l
 > 15 R 66 – 87 g/l

Pokyny k odběru koncentrace je závislá na poloze pacienta při odběru, rozdíl mezi koncentrací vsedě a vleže je asi 10 %. Je vhodné omezit cvičení a použití turniketu před odběrem. Zabránit hemolýze

Účel vyšetření diagnostika edému, polyurie, krvácení, diagnostika chorob ledvin, jater, bolestí kostí, diagnostika lymfoproliferativních a infekčních chorob

CK (kreatinkináza)

Odběrový systém	zkumavka s akcelerátorem srážení
Materiál	krev
Stabilita	sérum: 20 – 25°C – 2 dny, 4-8°C – 5 dnů plazma: 20 – 25°C – 7 dnů, 4-8°C – 7 dnů
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim
Výsledek	v den doručení (odpoledne)
Jednotky	μkat/l
Referenční meze	6 T- 1 R 0,17 – 2,44 μkat/l 1 R-15 R 0,20 – 2,27 μkat/l muži 0,40 – 3,20 μkat/l ženy 0,20 – 2,85 μkat/l
Pokyny k odběru	větší fyzická zátěž 24 před odběrem je nevhodná, stejně tak není vhodné provádět odběr po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích, zabránit hemolýze
Účel vyšetření	diagnostika infarktu myokardu, monitorování bolesti na hrudníku, monitorování závažnosti ischemie po operaci srdce, onemocnění kosterního svalstva, posouzení hematologických a nádorových chorob

CI (Chloridový anion)**Moč**

Odběrový systém	čistá nádobka sklo nebo plast, močová zkumavka
Materiál	moč
Stabilita	20–25°C – 1 den, 4-8°C – 2 dny
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim
Výsledek	v den doručení (odpoledne)
Jednotky	mmol/l, odpad za 24 hod. – mmol/24 h
Referenční meze	<15 R 51 – 131 mmol/24 h dospělí 110 – 270 mmol/24 h
Pokyny k odběru	stanovuje se obvykle ve sbírané moči (24 hodin)
Účel vyšetření	posouzení nerovnováhy tekutin a elektrolytů, monitorování účinku stravy s nízkým obsahem soli, posouzení poruch ledvin/ nadledvin, posouzení poruch acidobáze

Sérum

Odběrový systém	zkumavka s akcelerátorem srážení
Materiál	krev
Stabilita	sérum: 20-25°C – 8 hod., 4-8°C – 5 dnů plná krev: 20-25°C – 7 dnů, 4-8°C – 7 dnů
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim
Výsledek	v den doručení (odpoledne)
Jednotky	mmol/l
Referenční meze	6 T- 1 R 95 – 115 mmol/l 1R - 15 R 95 – 110 mmol/l dospělí 98 – 107 mmol/l

Pokyny k odběru nejsou zvláštní požadavky na odběr

Účel vyšetření odhalení poruch acidobáze a hodnocení stavu tekutin a extracelulární kationové rovnováhy, sledování příjmu NaCl, sledování ztrát chloridů, sledování poruch bilance draslíku

C-reaktivní protein (CRP)

Odběrový systém zkumavka s akcelerátorem srážení

Materiál krev

Stabilita sérum, plazma: 20-25°C – 1 den, 4-8°C – 5 dnů

Dostupnost rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim

Výsledek v den doručení (odpoledne)

Jednotky mg/l

Referenční meze < 5,0 mg/l

Pokyny k odběru silně chylózní séra znemožňují měření, v případě monitorování antibiotické léčby opakujte odběr po 12-24 hodinách, označení ultrasenzitivní CRP je vyhrazeno pro jiný typ metody

Účel vyšetření CRP patří mezi bílkoviny ze skupiny reaktantů akutní fáze, screening zánětlivých stavů jakéhokoli původu, rychlé rozpoznání zánětu u intenzivně léčených pacientů po transplantacích, při léčbě antibiotiky, sledování aktivity revmatizmu, diferenciální diagnostika mezi virovým a bakteriálním onemocněním

D-dimery

Odběrový systém zkumavka s citrátem sodným 1+9 (citrát+krev)

Materiál krev

Stabilita plazma: 20-25°C – 8 hod., 4-8°C – 8 hod.

Dostupnost rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim

Výsledek v den doručení (odpoledne)

Jednotky mg/l FEU

Referenční meze < 0,5 mg/l FEU

Účel vyšetření screening hluboké žilní trombózy, embolizace, krvácivých stavů, onemocnění jater, hodnocení akutního infarktu myokardu, nestabilní angíny pectoris, diseminované intravaskulární koagulace

Draselný kation (viz K)**Fe (viz Železo)****Fosfor (P)****FW (viz Sedimentace erytrocytů, ESR sedimentace)**

FT4 (viz T4 volný)**GGT (gamaglutamyltransferáza)**

Odběrový systém	zkumavka s akcelerátorem srážení		
Materiál	krev		
Stabilita	sérum:	20-25°C – 3 dny, 4-8°C – 5 dnů	
	plazma:	20-25°C – 3 dny, 4-8°C – 5 dnů	
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim		
Výsledek	v den doručení (odpoledne)		
Jednotky	μkat/l		
Referenční meze	6 T – 1 R	0,10 – 1,04 ukat/l	
	1 R -15 R	0,10 – 0,39 ukat/l	
	muži	0,17 - 1,19 μkat/l	
	ženy	0,10 – 0,70 μkat/l	
Pokyny pro odběr	zabránit hemolýze		
Účel vyšetření	onemocnění hepatobiliárního systému, hodnocení funkce jater a odhalení abúzu alkoholu, rozlišení mezi onemocněním skeletu a jater při zvýšení ALP		

Glukóza**Moč kvantitativně**

Odběrový systém	čistá nádobka plast nebo sklo, močová zkumavka		
Materiál	moč		
	maximální doba do zpracování 4 hod. při 20-25°C		
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek		
Výsledek	v den doručení (odpoledne)		
Jednotky	g/l, g/24 h		
Referenční meze	< 0,15 g/l, < 0,30 g/24 h		
Pokyny k odběru	většinou se stanovuje odpad ve sbírané moči za 24 hodin (jednotky g/24 h) – pozor na bakteriální kontaminaci		
Účel vyšetření	screening poruch glukózové tolerance, kontrola terapie diabetes mellitus (DM), sledování glykosurie v těhotenství a při poruchách ledvinných funkcí		

Moč kvalitativně

Odběrový systém	čistá nádobka plast nebo sklo, močová zkumavka		
Materiál	moč – střední proud		
	maximální doba do zpracování 2 hodiny při 20-25°C		
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim		
Výsledek	v den doručení (odpoledne)		
Jednotky	arbitrární jednotky		
Poznámka	stanovení se provádí v rámci vyšetření moče u diabetiků a ranní moče chemicky – diagnostickými proužky		

Sérum

Odběrový systém	zkumavka s akcelerátorem srážení
Materiál	krev
Stabilita	sérum: 20-25°C – 5 hod., 4-8°C – 3 dny plazma: EDTA s fluoridem sodným 20-25°C – 24 hod., 4-8°C – 1 týden
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim
Výsledek	v den doručení (odpoledne)
Jednotky	mmol/l
Referenční meze	1 – 6 T 1,7 – 4,2 mmol/l 6 T– 15 R 3,3 – 5,4 mmol/l Dospělí 3,9 – 5,6 mmol/l
Pokyny k odběru	v plné krvi bez antiglykolytické přísady dochází při laboratorní teplotě k poklesu glukózy až o 5 % za hodinu
Účel vyšetření	diagnostika DM, monitorování terapie DM, diagnostika při hypoglykemiích, monitorování energetického stavu a výživy hlavně intenzivně léčených pacientů

Glykovaný hemoglobin (GHbA1c)

Odběrový systém	zkumavka s K3EDTA
Materiál	krev
Stabilita	20-25°C – 2 dny, 4-8°C – 5 dnů
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí - pátek
Výsledek	v den doručení
Jednotky	mmol/mol
Referenční meze	20– 42 mmol/mol
Pokyny pro odběr	pacient nemusí být na lačno, lze použít heparinizovanou krev
Účel vyšetření	kontrola DM, kontrola léčby nestabilního IDDM a gestačního DM, diagnostika trvalé hyperglykémie

Hamburgerův sediment

Odběrový systém	čistá nádobka sklo nebo plast
Materiál	moč
Stabilita	maximální doba zpracování do 2 hodin při 20–25°C
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek
Výsledek	v den doručení (odpoledne)
Jednotky	elementy/sec – erytrocyty, leukocyty, válce
Referenční meze	ery < 35 /s leu < 70 /s válce <1/s
Pokud sběr moči na Hamburgerův sediment probíhá v laboratoři, je pacient poučen na místě. Pokud pacient sbírá moč doma, je nutné celý objem moče dopravit do laboratoře nejpozději do 1 hodiny. Je-li interval mezi ukončením sběru moče a dodáním do laboratoře větší než 2 hodiny nebo poskytnutý objem menší než 60 ml, analýza se neprovede.	

Hořčík (viz Mg)**Chloridový anion (viz Cl)****Cholesterol celkový**

Odběrový systém zkumavka s akcelerátorem srážení

Materiál krev

Stabilita sérum: 20–25°C – 1 den, 4–8°C – 7 dnů
plazma: 20–25°C – 3 hod, 4–8°C – 10 dnů

Dostupnost rutinní vyšetření pondělí – pátek

Výsledek v den doručení (odpoledne)

Jednotky mmol/l

Referenční meze 6 T – 1 R 2,6 – 4,2 mmol/l
1 R – 15 R 2,6 – 4,8 mmol/l
dospělí <40 R 2,9 – 5,0 mmol/l
> 40 R 2,9 – 5,2 mmol/l

Pokyny pro odběr rozdíl mezi hodnotami vsedě a vleže je 6 – 15 %, před odběrem je nutné 12hodinové lačnění

Účel vyšetření hodnocení lipidového metabolismu, hodnocení rizika koronární choroby srdce, hodnocení stavu pacientů s aterosklerózou, pacientů v dialyzačním programu, sledování pacientů s hypertenzí, diagnostika nefrotického syndromu, pankreatitidy, hyperurikémie, chorob jater, hodnocení stavu pacientů s xantomy

Cholesterol HDL

Odběrový systém zkumavka s akcelerátorem srážení

Materiál krev

Stabilita sérum: 20–25°C – 1 den, 4–8°C – 5 dnů
plazma: 20–25°C – 12 hod., 4–8°C – 5 dnů

Dostupnost rutinní vyšetření pondělí – pátek

Výsledek v den doručení (odpoledne)

Jednotky mmol/l

Referenční meze < 15 R 1,0 – 1,8 mmol/l
muži 1,0 – 2,1 mmol/l
ženy 1,2 – 2,7 mmol/l

Pokyny pro odběr rozdíl mezi hodnotami vsedě a vleže je 6 – 15 %, před odběrem nutno 12 hod. lačnit

Účel vyšetření klasifikace dyslipoproteinémií, posouzení rizika ischemické choroby srdce, genetický screening

Cholesterol LDL

Odběrový systém zkumavka s akcelerátorem srážení

Materiál krev

Stabilita	sérum: 20-25°C – 12 hod., 4-8°C – 10 dnů plazma: 20-25°C – 12 hod., 4-8°C – 10 dnů urychleně centrifugovat
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek
Výsledek	v den doručení
Jednotky	mmol/l
Referenční meze	< 5 R 0,52 – 1,45 mmol/l 5 R -15 R 1,20 - 3,44 mmol/l dospělí 1,20 – 3,00 mmol/l
Účel vyšetření	posouzení rizika ischemické choroby srdce, posouzení dyslipoproteinémií a jejich diferenciální diagnostika, genetický screening, hodnocení aktivity aterogenního procesu, diagnostika inzulin dependentního DM a hyperurikémie

K (Draselný kation)

Moč

Odběrový systém	čistá nádobka plast nebo sklo, močová zkumavka
Materiál	moč
Stabilita	20–25°C 8 hod., 4-8°C – 1 den
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim
Výsledek	v den doručení (odpoledne)
Jednotky	mmol/l, ztráty za 24 hod. – mmol/24 h
Referenční meze	<15 R 20 – 60 mmol/24 h D ospělí 35 – 80 mmol/24 h
Pokyny k odběru	většinou se stanovuje odpad ve sbírané moči za 24 hodin (jednotky mmol/d)
Účel vyšetření	diferenciální diagnostika hyper a hypokalémií v důsledku renálních nebo extrarenálních poruch

Sérum

Odběrový systém	zkumavka s akcelerátorem srážení
Materiál	krev
Stabilita	sérum: 20-25°C – 8 hod., 4-8°C – 5 dnů plazma: 20-25°C – 8 hod., 4-8°C – 5 dnů
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim
Výsledek	v den doručení (odpoledne)
Jednotky	mmol/l
Referenční meze	6 T – 1 R 4,0 – 6,2 mmol/l 1 R - 15 R 3,6 – 5,9 mmol/l >15 R 3,5 – 5,1 mmol/l
Pokyny k odběru	neanalyzovat hemolytické vzorky – hemolýza zvyšuje výsledky, odběr pouze s krátkým zatažením manžety, centrifugace rychle po odběru
Účel vyšetření	monitorování ledvinných funkcí, monitorování acidobazické rovnováhy a metabolismu glukózy, hodnocení nervosvalových poruch, hodnocení endokrinních poruch, odhalení původu dysrytmií, monitorování léčby diuretiky, monitorování hypertenze

Kreatinin

Odběrový systém	zkumavka s akcelerátorem srážení
Materiál	krev
Stabilita	sérum: 20-25°C - 3 dny, 4-8°C – 7 dnů plazma: 20-25°C - 3 dny, 4-8°C – 7 dnů
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim
Výsledek	v den doručení (odpoledne)
Jednotky	μmol/l
Referenční meze	6 T – 1 R 21 – 55 μmol/l 1 R – 15 R 27 – 88 μmol/l muži 62 – 106 μmol/l ženy 44 – 80 μmol/l
Pokyny k odběru	nejsou zvláštní požadavky na odběr

Moč:

Odběrový systém	čistá nádobka plast nebo sklo, močová zkumavka
Materiál	moč
Stabilita	20°–25° C - 1 den, 4-8° C – 4 dny
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim
Výsledek	v den doručení (odpoledne)
Jednotky	mmol/l
Referenční meze	muži 3,45 – 22,9 mmol/l ženy 2,47 - 19.2 mmol/l sběr 24 hod. - mmol/d - 4,0 – 18,0 mmol/d

Pokyny k odběru: při stanovení odpadu kreatininu ve sbírané moči (24 hodin-jednotky mmol/d) se do laboratoře přinese pouze vzorek dobře promíchané moče s poznamenaným objemem s přesností na ml a dobou sběru. Před a v průběhu sběru je vhodné vyhnout se větší fyzické námaze.

Účel vyšetření posouzení glomerulární filtrace ledvin, screening poškození ledvin, monitorování dialyzovaných pacientů, posouzení metabolických poruch (hyperurikemický syndrom, DM), posouzení stavů se zvýšenou proteosyntézou, předoperační vyšetření, sledování komplikovaného těhotenství, sledování nádorových onemocnění, posouzení chorob urogenitálního traktu

Krevní nátěr – diferenciální rozpočet leukocytů (DIF) - mikroskop

Odběrový systém	zkumavka s K3EDTA
Materiál	krev
Stabilita	20-25°C 5 hod., 4-8°C – 1 den
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek
Výsledek	v den doručení (odpoledne), v případě doručení vzorku po 13. hod. - následující

den, pokud se nedomluví jinak

Pokyny k odběru při odběru je nutné dodržet správný poměr krve a antikoagulační přísady

Poznámka v mikroskopickém nátěru se popisují změny leukocytů, erytrocytů a trombocytů a zárodečné řady leukocytů, které se za normálních okolností v periferní krvi nevyskytují

Účel vyšetření hodnocení kapacity organismu odolávat nebo překonávat infekci, odhalení a identifikace různých typů leukémií, určení stupně a závažnosti infekce, odhalení alergie a její závažnosti

	Doporučené meze - jednotky - jednina		
	Věk	Dolní	Horní
Neutrofily	0,5 – 1 R	0,21	0,42
	1 – 2 R	0,21	0,43
	2 - 4 R	0,23	0,52
	4 – 6 R	0,32	0,61
	6 – 8 R	0,41	0,63
	8 – 10 R	0,43	0,64
	10 – 15 R	0,44	0,67
	dospělí nad 15 R	0,45	0,70
Tyče	0,5 – 100 R	0,00	0,04
Lymfocyty	0,5 – 1 R	0,51	0,71
	1 – 2 R	0,49	0,71
	2 – 4 R	0,40	0,69
	4 – 6 R	0,32	0,60
	6 – 8 R	0,29	0,52
	8 – 10 R	0,28	0,49
	10 – 15 R	0,25	0,48
	dospělí nad 15 R	0,20	0,45
Monocyty	0,5 - 6 R	0,01	0,09
	6 – 8 R	0,00	0,09
	8 – 10 R	0,00	0,08
	10–15 R	0,00	0,09
	dospělí nad 15 R	0,02	0,12
Eozinofily	0,5 - 8 R	0,00	0,07
	8 – 10 R	0,00	0,04
	10 – 15 R	0,00	0,07
	15 – 100 R	0,00	0,05
Bazofily	0,5 – 100 R	0,00	0,02

Krevní obraz z analyzátoru

Odběrový systém zkumavka s K3EDTA

Materiál krev

Stabilita maximální doba do zpracování 5 hodin při 20° – 25° C

Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim
Výsledek	v den doručení (odpoledne)
Referenční meze	viz tabulka pro krevní obraz
Upozornění	při odběru je nutné dodržet správný poměr krve a antikoagulační přísady
Účel vyšetření	diagnostika infekce nebo zánětu, stanovení potřeby dalších diferenciálních testů, diagnostika a klasifikace anémií, určení závažnosti anémií, diagnostika, leukopenií, leukocytóz, trombocytopenií, trombocytóz, abnormálních stavů hydratace, polycytémií, polyglobulií, monitorování odpovědi na chemoterapii nebo radioterapii

Krevní obraz	věk – pohlaví	Referenční meze		Jednotky
Leukocyty	1 - 2 R	6,0	17,5	10 ⁹ /l
	2 – 4 R	5,5	17,0	
	4 – 6 R	5,0	15,5	
	6 – 8 R	4,5	14,5	
	8 – 15 R	4,5	13,5	
	dospělí	4,0	10,0	
Erytrocyty	6 M - 2 R	3,7	5,3	10 ¹² /l
	2 – 6 R	3,9	5,3	
	6 – 12 R	4,0	5,2	
	M 12 – 15 R	4,5	5,3	
	Ž 12 – 15 R	4,1	5,1	
	muži	4,0	5,8	
Hemoglobin	ženy	3,8	5,2	g/l
	6 M - 2 R	105	135	
	2 – 6 R	115	135	
	6 – 12 R	115	155	
	M 12 – 15 R	130	160	
	Ž 12 – 15 R	120	160	
Hematokrit	muži	135	175	1
	ženy	120	160	
	6 M - 2 R	0,33	0,39	
	2 – 6 R	0,34	0,40	
	6 – 12 R	0,35	0,45	
	M 12 – 15 R	0,37	0,49	
MCV – střední objem erytrocytů	Ž 12 – 15 R	0,36	0,46	fl
	muži	0,40	0,50	
	ženy	0,35	0,47	
	6 M - 2 R	70,0	86,0	
	2 – 6 R	75,0	87,0	
	6 – 12 R	77,0	95,0	
	M 12 - 15 R	78,0	98,0	
	Ž 12- 15 R	78,0	102,0	
	dospělí	82,0	98,0	

MCH – barvivo erytrocytů	6 M - 2 R	23,0	31,0	pg
	2 – 6 R	24,0	30,0	
	6 – 12 R	25,0	33,0	
	12 – 15 R	25,0	35,0	
	dospělí	28,0	34,0	
MCHC – střední barevná koncentrace	6 M - 2 R	300	360	g/l
	2 – 15 R	310	370	
	dospělí	320	360	
RDW – CV% šíře distribuce ery	do 15 R	11,5	14,5	%
	dospělí	10,0	15,2	
Trombocyty PLT	do 15 R	150	450	10 ⁹ /l
	dospělí	150	400	

Krvácivost

Odběrový systém jehla (haemolanceta)
Materiál kapilární krev – břicho prstu
Stabilita maximální doba do zpracování – ihned
Dostupnost rutinní vyšetření pondělí – pátek
Výsledek v den doručení
Jednotky sec
Referenční meze 90-300 s

Kyselina močová (Urát)

Odběrový systém zkumavka s akcelerátorem srážení
Materiál krev
Stabilita sérum: 20-25°C – 3 dny, 4-8°C – 5 dnů
plazma: 20-25°C – 3 dny, 4-8°C – 5 dnů
Dostupnost rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim
Výsledek v den doručení (odpoledne)
Jednotky $\mu\text{mol/l}$
Referenční meze 6 T – 1 R 120 – 340 $\mu\text{mol/l}$
1 R - 15 R 140 – 340 $\mu\text{mol/l}$
muži >15 R 202 – 417 $\mu\text{mol/l}$
ženy >15 R 143 – 339 $\mu\text{mol/l}$
Pokyny k odběru před odběrem vyloučit větší fyzickou námahu
Účel vyšetření diagnostika dny, poruchy funkce ledvin, poruchy metabolismu tuků, diagnostika artritid, urolitiázy, diagnostika myeloproliferativních chorob, hemoblastóz, a zhoubných nádorů, screeningový profil ischemické choroby srdce, důkaz oxidačního stresu

Mikroalbumin - MA (viz Albumin v moči)

Mg (Hořčík celkový)

Odběrový systém	zkumavka s akcelerátorem srážení
Materiál	krev
Stabilita	sérum, plazma: 20°–25° C - 3 dny, 4- 8°C - 5 dnů
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek
Výsledek	v den doručení (odpoledne)
Jednotky	mmol/l
Referenční meze	5 M – 6 R 0,70 – 0,95 mmol/l 6 R – 12 R 0,70 – 0,86 mmol/l 12 R – 20 R 0,70 – 0,91 mmol/l > 20 R 0,66 – 1,07 mmol/l
Pokyny k odběru	je nutné zabránit dlouhému stažení paže. Centrifugaci provést do 30 minut.
Účel vyšetření	hodnocení stavu elektrolytů, posouzení nervosvalových a ledvinových funkcí, monitorování srdečních dysrytmí, diagnostika změn na EKG, monitorování akutního infarktu myokardu, monitorování dlouhodobé léčby diuretiky, sledování alkoholizmu, chorob ledvin, parenterální výživy

Moč chemicky a sediment

Odběrový systém	močová zkumavka (plastová se žlutou zátkou)
Materiál	moč – střední proud
Stabilita	maximální doba do zpracování 2 hodin při 20-25°C
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim
Výsledek	v den doručení
Jednotky	chemická analýza – arbitrární jednotky sediment – počet jednotlivých elementů/ µl vč. arb. jednotek
Referenční meze	chemická analýza – negativní pro všechny hodnocené parametry sediment – viz tabulka „Hodnocení močového sedimentu“
Parametry	pH, bílkovina, glukóza, urobilinogen, bilirubin, ketolátky, nitrity, krev (erytrocyty), leukocyty, specifická hustota
Pokyny k odběru	10 ml moče, doručení vzorku do laboratoře co nejdříve od vymočení, při pozdějším dodání se ve vzorku množí bakterie, mění se pH a buňky degenerují
Účel vyšetření	diagnostika mnoha různých chorob a patologických stavů – onemocnění ledvin, močových cest, screening poruch glukózové tolerance, kontrola DM, sledování glykosurie v těhotenství, posouzení ketonurie, diagnostika krvácení do močového traktu, diagnostika hemolytických anémií, infekcí nebo závažné intravaskulární hemolýzy, příčiny ikteru, infekce močových cest, diferenciální diagnostika hepatálních a hematologických poruch, záchyt parazitárních infekcí, urolitiázy, metabolických onemocnění (vzácné krystaly)

Hodnocení močového sedimentu

počet elem./ul	arb.jedn. 0	1	2	3	4
Erytrocyty	0 - 9	10 – 50	51 – 100	101 - 500	> 500
Leukocyty	0 - 14	15 - 50	51 - 100	101 - 250	> 250
Válce hyalinní	0 - 1	2 - 4	5 - 10	11 - 20	> 20
Válce granulované	0	1 – 4	5 -10	11 - 20	> 20
Epitelie ploché	0 – 19	20 - 50	51 – 100	101 - 200	> 200
Epitelie kulovité	0 – 15	16 -50	51 – 100	101 - 200	> 200
Krystaly - oxal., kys. močové	0 -100	101 – 200	201 – 350	351 - 500	> 500
Tripelfosfáty	0	1 – 5	6 - 20	21 - 50	> 50
Amorfní drť	0	1 - 50	51 – 100	101 - 500	> 500
Bakterie	0 – 40	41 – 80	81 – 150	151 - 400	> 400
Hlen	0 – 100	101 – 200	201 – 350	351 - 500	> 500
Kvasinky, spermie	0	přítomny			
Trichomonas vaginalis	0	1 – 4	5 - 10	11 - 40	> 40

Na (Sodný kation)**Moč**

Odběrový systém čistá nádobka sklo nebo plast, močová zkumavka

Materiál moč

Stabilita 20-25°C – 8 hod., 4-8°C – 1 den

Dostupnost rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim

Výsledek v den doručení (odpoledne)

Jednotky mmol/l, odpad za 24 hod - mmol/24 h

Referenční meze 1 R – 7 R 20 – 60 mmol/24 h

7 R – 15 R 50 – 120 mmol/24 h

dospělí >15 R 120 – 220 mmol/24 h

Pokyny k odběru stanovuje se obvykle ve sbírané moči (24 hodin)

Účel vyšetření posouzení rovnováhy tekutin a elektrolytů, hodnocení poruch ledvin a nadledvin, monitorování účinku neslané diety

Sérum

Odběrový systém zkumavka s akcelerátorem srážení

Materiál krev

Stabilita 20-25°C – 1 den , 4-8°C – 2 týdny

plazma není vhodná – nestabilní

Dostupnost rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim

Výsledek v den doručení (odpoledne)

Jednotky mmol/l

Referenční meze 6 T - 15 R 135 – 146 mmol/l
dospělí 136 – 145 mmol/l

Pokyny k odběru nejsou zvláštní pokyny pro odběr

Účel vyšetření hodnocení acidobáze, nervosvalových a ledvinových funkcí, ztrát tekutin

Odhad clearance kreatininu, MDRD – výpočet

Přímé měření GF je komplikované a náročné vyšetření, proto se používá její odhad, který je založen na měření koncentrace kreatininu v séru. Výpočet dle rovnice MDRD: sérový kreatinin, věk, pohlaví, rasa. Výpočet byl navržen hlavně pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin.

Referenční meze >15 R 1,00 – 3,00 ml/s

Odhad clearance kreatininu, CKD-EPI – výpočet

V současné době preferovanější výpočet pro odhad glomerulární filtrace kreatininu, který lépe reflektuje celou populaci v séru. CKD-EPI je novější výpočet než MDRD. Odhad GF spolehlivěji detekuje poškození ledvin v časných stádiích nebo GF zdravé populace.

Referenční meze >15 R 1,00 – 3,00 ml/s/1,73 m²

OGTT, Glykemická křivka

Odběrový systém nesrážlivá krev s NaF

Jednotky mmol/l

Dostupnost denně, v Přelouči po předchozím objednání pouze v pátek
stanovení glukózy po zátěži (roztokem se 75 g glukózy)

Referenční rmeze	běžná populace	mmol/l	gravidní	mmol/l
na lačno	GLK 1 : 0 – 110 R	3,9 - 5,6	3,3 – 5,1	
po 1 hodině	GLK 2 : 0 – 110 R	5,6 - 8,8	3,3 – 10,0	
po 2 hodinách	GLK 3 : 0 – 110 R	5,6 - 7,8	3,5 – 8,5	

Orální glukózový toleranční test se používá k potvrzení či vyloučení diagnózy diabetes mellitus v případě, že diagnóza není jednoznačně potvrzena nálezem glukózy na lačno vyšší než 7,0 mmol/l. Jde jednak o stavy s hraniční hodnotou (5,6 - 6,99 mmol/l), jednak v situacích s hodnotou glukózy nižší než 5,6 mmol/l, při nichž je podezření na poruchu tolerance glukózy z předchozích vyšetření nebo jedná-li se o jedince se zvýšeným rizikem vzniku diabetu. Při nálezu porušené glukózové tolerance se OGTT opakuje ve dvouletých intervalech.

Během těhotenství se OGTT vyšetřuje ve 24. - 28. týdnu gravidity. Test se neprovede, pokud je hodnota glykémie na lačno > 5,1, mmol/l.

Osmolalita v séru – výpočet

Osmolalita je vypočtena ze sérových hodnot sodíku, urey a glukózy.

Jednotky mmol/kg

Referenční meze 275 – 295 mmol/kg

Účel vyšetření osmolalita je daná koncentrací všech osmoticky aktivních látek rozpuštěných v roztoku. Je nejdůležitějším parametrem k posouzení vodní bilance.

P (Fosfor)

Odběrový systém zkumavka s akcelerátorem srážení
 Materiál krev
 Stabilita serum: 20°–25° C - 4 dny, 4-8° C – 7 dnů
 plazma: 20 -25° C – 4 dny, 4-8° C – 7 dnů
 Dostupnost rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim
 Výsledek v den doručení (odpoledne)
 Jednotky mmol/l
 Referenční meze 6 T – 1 R 1,29 – 2,26 mmol/l
 1 R - 15 R 1,16 – 1,90 mmol/l
 > 15 R 0.81 - 1,45 mmol/l
 Pokyny pro odběr po odběru rychle centrifugovat. Vzhledem k dennímu rytmu je vhodnější ranní odběr.
 Účel vyšetření diagnostika onemocnění ledvin a sledování acidobazické rovnováhy, detekce endokrinních a skeletálních poruch metabolismu vápníku

Protrombinový test – Quick (viz Tromboplastinový čas)

PSA – Prostatický antigen celkový

Odběrový systém zkumavka s akcelerátorem srážení
 Materiál krev
 Stabilita: sérum: 20-25°C – 3 hod., 4-8°C – 5 dnů
 plazma: 20-25°C – 3 hod., 4-8°C – 2 týdny
 Dostupnost rutinní vyšetření pondělí – pátek
 Výsledek v den doručení (odpoledne)
 Jednotky µg/l
 Referenční meze muži do 40 R <1,4 µg/l
 do 50 R <2,0 µg/l
 do 60 R <3,1 µg/l
 do 70 R < 4,1 µg/l
 nad 70 R < 4,4 µg/l
 při hodnotě nad 4 µg/l se měří volný PSA a hodnotí se poměr FPSA/PSA – nad 25 je výsledek negativní
 Pokyny pro odběr neodebírat po digitálním a ultrazvukovém rektálním vyšetření nebo zvýšené fyzické námaze – jízda na kole
 Účel vyšetření screening onemocnění prostaty, monitorování průběhu zhoubných onemocnění prostaty a hodnocení jejich léčby

PSA – volný (prostatický antigen – volná frakce, FPSA)

Odběrový systém	zkumavka s akcelerátorem srážení
Materiál	krev
Stabilita:	sérum: 20-25°C – 3 hod., 4-8°C – 2 dny plazma: 20-25°C – 3 hod., 4-8°C – 2 týdny
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí - pátek
Výsledek	v den doručení (odpoledne)
Jednotky	µg/l
Referenční meze	hodnotí se poměr fPSA/PSA > 25,0
Pokyny pro odběr	odběr provádět nejdříve za 48 hodin po každém vyšetření per rectum nebo masáži prostaty nejdříve 2 týdny po biopsii prostaty
Pozn.	omezená preskripce – ordinovat může pouze urolog nebo onkolog
Účel vyšetření	diferenciální diagnostika mezi nezhoubnou hyperplazií prostaty a zhoubným nádorem prostaty, vyšetření při zvýšených hodnotách PSA > 4 µg/l

Sedimentace krve – FW

Odběrový systém	citrát sodný 1+4
Materiál	krev nutno dokonale promíchat a vložit do sedimentačního stojanu nejlépe v místě odběru
Dostupnost	rutinní vyšetření denně pondělí – pátek
Výsledek	v den doručení (odpoledne)
Jednotky	mm
Referenční meze	muži 3 – 9 mm/1 hod., 6 – 20 mm/2 hod ženy 7 – 12 mm/1 hod., 14 – 28 mm/2 hod
Pokyny pro odběr	při odběru je nutné dodržet přesně poměr krve a protisrážlivého činidla
Účel vyšetření	orientační, velmi sensitivní ale nespecifické vyšetření, hodnota je závislá na bílkovinném složení plazmy, hlavně na přítomnosti fibrinogenu, který s erytrocyty tvoří větší částice s rychlejší sedimentací, podává nespecifickou informaci o aktivitě celkové zánětlivé reakce, zhoubných onemocnění, monitorování průběhu různých onemocnění

ESR sedimentace

Odběrový systém	K2 nebo K3EDTA
Materiál	krev
Výsledek	v den doručení
Jednotky	mm/h
Referenční meze	0-14R muži/ženy 2-34 15-50R muži 2-28 ženy 2-37 51-70R muži 2-37 ženy 2-39 >70 muži/ženy 3-46
Pokyny pro odběr	při odběru je nutné dodržet přesně poměr krve a protisrážlivého činidla

Sodný kationt (viz Na)**Triglyceridy (triacylglyceroly – TAG)**

Odběrový systém	zkumavka s akcelerátorem srážení
Materiál	krev
Stabilita	sérum, plazma: 20-25°C – 3 dny, 4-8°C – 10 dnů
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek
Výsledek	v den doručení (odpoledne)
Jednotky	mmol/l
Referenční meze	6 T – 1 R 0,50 – 2,22 mmol/l 1 R – 15 R 1,00 – 1,64 mmol/l dospělí 0,45 – 1,70 mmol/l
Pokyny pro odběr	odběr provádět po 12hodinovém lačnění a 24hodinovém vyloučení alkoholu
Účel vyšetření	screening hyperlipidémie, identifikace nefrotického syndromu, posouzení rizika pacienta s ischemickou chorobou srdce a aterosklerózou, hodnocení nefropatie a tyreopatie, vyloučení hypertriacylglycerlémie při pankreatitidě, DM, alkoholismu, genetický screening

Tromboplastinový čas (Quick, Protrombinový test)

Odběrový systém	zkumavka s citrátem sodným 1+9 (citrát+krev)
Materiál	krev
Stabilita	plazma: 20-25°C – 6 hod., 4-8°C – 1 den
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek, statim
Výsledek	v den doručení (odpoledne)
Jednotky	hodnotí se poměr (ratio) - čas pacienta/ normální kontrolní plazma a INR - poměr vztažený k mezinárodnímu standardu účinnosti použité reagensie – tzv. ISI reagensie (International Sensitivity Index)
Referenční meze	poměr (ratio) 0,80 – 1,25 , rozmezí pro INR se neuvádí
Pokyny pro odběr	při odběru je nutné dodržet přesně poměr krve a protisrážlivého činidla –odebrat přesně po rysku
Účel vyšetření	celkové hodnocení vnějších koagulačních faktorů V, VII, X, protrombinu a fibrinogenu, monitorování léčby perorálními antikoagulanty, screening na zjištění deficitu vitamínu K, diagnostika diseminované intravaskulární koagulace, diagnostika inhibitorů faktorů II, V a X, screening poruch hemostázy včetně tvorby fibrinu

Troponin T

Odběrový systém	zkumavka s akcelerátorem srážení, příp. K3EDTA, Li-heparin
Materiál	krev
Stabilita	sérum, plazma: 20-25°C – 6 hod., 4-8°C – 4 dny
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek
Výsledek	v den doručení (odpoledne)

Jednotky	ng/l
Referenční meze	0 – 100 R 0 – 14 ng/l
Účel vyšetření	diagnostika akutního (subakutního) infarktu myokardu a mikroinfarktu, neinvazivní určení velikosti infarktového ložiska, hodnocení poškození myokardu při úrazech, hodnocení léčby po akutním infarktu

TSH (Tyreotropin)

Odběrový systém	zkumavka s akcelerátorem srážení
Materiál	krev
Stabilita:	sérum, plazma: 20-25°C - 1 den, 4-8°C – 3 dny vyvarovat se opakovanému zamrazování, vyšetření ze séra má přednost
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí – pátek
Výsledek	v den doručení (odpoledne)
Jednotky	mU/l
Referenční meze	0 – 100 R 0,27 – 4,20 mU/l
Pokyny k odběru	vzhledem k diurnálnímu rytmu odebírat ráno nalačno
Účel vyšetření	diagnostika onemocnění štítné žlázy

T4 volný (Tyroxin volný), FT4

Odběrový systém	zkumavka s akcelerátorem srážení
Materiál	krev
Stabilita:	sérum: 20-25°C – 1 den, 4-8°C – 2 dny, -20 °C – 4 týdny, opakovaně nezamrazovat
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí–pátek
Výsledek	v den doručení (odpoledne)
Jednotky	pmol/l
Referenční meze	0–100 R 12,00 – 22,00 pmol/l
Pokyny k odběru	separace do 6 hodin po odběru, stanovení možné i z plazmy – heparin, EDTA
Účel vyšetření	diagnostika onemocnění štítné žlázy, měření metabolicky aktivní formy hormonu

Urea (Močovina)

Odběrový systém	zkumavka s akcelerátorem srážení
Materiál	krev
Stabilita:	sérum, plazma: 20–25° C–1 den, 4-8° C–2 týdny
Dostupnost	rutinní vyšetření pondělí–pátek, statim
Výsledek	v den doručení (odpoledne)
Jednotky	mmol/l
Referenční meze	6 T–1 R 1,4 – 5,4 mmol/l 1 R–15 R 1,8 – 6,7 mmol/l dospělí >15 R 2,8 – 8,1 mmol/l
Pokyny k odběru	před odběrem není vhodná dieta s vysokým obsahem bílkovin
Účel vyšetření	posouzení funkce ledvin, diagnostika onemocnění ledvin, hodnocení hydratace, stanovení bilance dusíku, hodnocení stavu pacienta v dialyzačním programu, diferenciální diagnostika komatózních stavů

Vápník (viz Ca)**Železo (Fe)**

Odběrový systém zkumavka s akcelerátorem srážení

Materiál krev

Stabilita sérum: 20-25 °C 6 hod., 4-8 °C–3 dny

plazma: 20-25 °C 4 dny, 4-8 °C–7 dnů

Dostupnost rutinní vyšetření pondělí–pátek

Výsledek v den doručení (odpoledne)

Jednotky $\mu\text{mol/l}$

Referenční meze do 6 T 11,0 – 36,0 $\mu\text{mol/l}$

6 T - 1 R 6,0 – 28,0 $\mu\text{mol/l}$

1 R - 15 R 4,0 – 24,0 $\mu\text{mol/l}$

>15 R 5,8 – 34,5 $\mu\text{mol/l}$

Pokyny k odběru zabránit hemolýze, vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odběr vždy ráno

Účel vyšetření diagnostika anémií, podezření na latentní nebo manifestní nedostatek železa, předávkování železem, diagnostika hemochromatózy, poruchy zpracování železa, monitorování dlouhodobé parenterální výživy

Pokyny pro pacienty**Odběr žilní krve**

Odpoledne a večer před odběrem vynechejte tučná jídla, 24 hodin nepijte alkohol, 12 hodin nekuřte. Další případné podmínky odběru Vám sdělí ordinující lékař. Pokud je to možné, vynechejte po dohodě s lékařem alespoň jeden den léky.

Odběry jsou prováděny nalačno, nejlépe ráno, pokud lékař neurčí jinak.

Ráno před odběrem je vhodné vypít 250 ml hořkého čaje nebo neslazené vody.

U odběru upozorněte na případnou alergii (dezinfekce, náplast), na užívání léků ovlivňujících srážení krve, nebo na skutečnost, že Vám bývá při odběru nevolno.

K odběru si vezměte s sebou průkazku zdravotní pojišťovny a vyplněnou žádanku.

Sběr moče

Základní podmínkou pro získání správného výsledku je dodržení zásad správného sběru:

- sběr začíná vymočením mimo sběrnou nádobku
- sběrná nádoba musí být čistá a uchovávaná na tmavém, chladném místě
- močte do jiné nádoby a veškerou moč přelévejte do sběrné nádoby
- po ukončení sběrného intervalu vymočte poslední porci moče a přidejte do sběrné nádoby
- po ukončení sběru změřte objem s přesností na 10 ml, obsah důkladně promíchejte a odlijte vzorek moče do menší nádoby nebo zkumavky, kterou označíte svým jménem a odnesete co nejdříve do laboratoře
- pokud není určeno lékařem jinak, jezte svou běžnou stravu, obvyklé léky a vypijte asi 2 l tekutin

Sběr moče na mikroalbuminurii

V současné době se obvykle vyšetření albuminu v moči – mikroalbuminurie provádí z ranní moče. Pokud lékař požaduje sběr moči, je nutné ho zajistit během nočního odpočinku (optimálně 6-9 hodin). Sběr moče začíná večer posledním vymočením mimo sběrnou nádobu. V průběhu noci nebo až ráno vymočíte veškerou moč do sběrné nádoby a sběr končí. Je nutné si zaznamenat dobu sběru s přesností na minuty a objem moče s přesností na mililitry, promíchat a donést vzorek v menší nádobce nebo zkumavce co nejdříve do laboratoře. Pokud nemáte možnost změřit objem sbírané moče doma, doneste celý objem.

Hamburgerův sediment

Sběrné období trvá 3 hodiny, s tolerancí maximálně ± 30 minut. Na žádanku je potřeba uvést přesný čas sběru v minutách. Sběr se provádí po hygienické očištění zevního genitálu. Sběr moče začíná vymočením do záchodu, další močení po dobu 3 hodin probíhá do sběrné nádoby označené vaším jménem. K analýze předejte celý objem moče nejpozději do 1 hodiny. Při předání moče do laboratoře po více jak dvou hodinách po ukončení sběru je vzorek nevhodný k vyšetření. Objem moče menší než 60 ml se nevyšetřuje.

Ranní moč

Pokud Vám lékař naordinoval vyšetření ranní moče, je třeba si obstarat zkumavku (ve zdravotních potřebách nebo vyžádat v laboratoři) a označit ji svým jménem. Po hygienické očištění zevního genitálu vymočte část moče do záchodové mísy a nádobku naplňte středním proudem moče. Ženy by neměly toto vyšetření podstupovat v období během a těsně po menzes. Ranní moč předejte co nejdříve do laboratoře nejlépe do 1 hodiny.

OGTT – Orální glukózový toleranční test

Test je určen k diagnostice diabetu (DM) a porušené glukózové tolerance (IGT). Pro objednání potřebujete žádanku od lékaře. Informace k provedení testu získáte na příslušném odběrovém místě:

- lačnění před vlastním testem musí trvat minimálně 10 hodin
- nekuřte před ani v průběhu testu
- během testu se vyvarujte fyzické námahy
- test OGTT trvá 2 hodiny (od vypití testovacího nápoje až po poslední odběr krve)

Další pokyny a upozornění

Zdroje chyb při odběru žilní krve

- chyby při přípravě pacienta
- chyby způsobené nesprávným použitím turniketů při odběru
- chyby vedoucí k hemolýze vzorku
- nedodržování správného poměru vzorku krve a aditiv ve zkumavce

Chyby při přípravě pacienta

- pacient nebyl nalačno – zvýší koncentrace glukózy, požití tuky mohou způsobit přítomnost chylomikrů v séru
- odběr nebyl proveden ráno, nebo byl proveden po mimořádné fyzické zátěži (včetně noční směny)
- pacient nevysadil některé léky
- dehydratace organismu v případě příliš úzkostlivého dodržování lačnění a nepřijímání tekutin před odběrem

Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru

Dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení se zataženou paží před odběrem vede ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži. Ovlivněny jsou takto např. koncentrace draslíku nebo proteinů.

Chyby vedoucí k hemolýze vzorku

Hemolýza vadí řadě biochemických vyšetření, zejména proto, že řada látek přešla z erytrocytů do séra nebo plazmy, nebo že zbarvení interferuje s vyšetřovacím postupem.

Hemolýzu působí:

- znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku
- použití příliš úzké jehly, kterou se pak krev nasává pod vyšším tlakem
- prudké třepání krve ve zkumavce (např. po nešetrném transportu krve hned po odběru)

Nedodržení správného poměru krve a aditiv ve zkumavce

- použití nesprávných zkumavek (s nesprávným protisrážlivým činidlem) - znemožňuje vyšetření
- nedodržení objemu odebrané krve do zkumavek s protisrážlivým činidlem zásadně ovlivňuje provedení vyšetření
- dlouhá doba od provedení odběru a oddělení krevního koláče
nebo erytrocytů od séra nebo plazmy (řada látek včetně enzymů přechází z krvinek do séra nebo plazmy, rozpad trombocytů)
- krev byla vystavena teplu nebo přímému slunečnímu světlu

Lékové interference

Analytická interference léčiv je důležitý faktor, se kterým je potřeba počítat při interpretaci výsledků.

Podávání léků může ovlivňovat biochemická vyšetření dvojím způsobem:

- působí na metabolismus stanovované veličiny
- ruší při vlastní chemické reakci – např. maskování přítomnosti glukózy v moči kyselinou askorbovou při vyšetření diagnostickým proužkem

Při běžném laboratorním vyšetření není zjistitelná ani aktuální koncentrace léčiva (příp. jeho metabolitů), tedy i jeho míra interference. Těmto situacím není možné se zcela vyhnout a je třeba s nimi počítat.

Faktor	Příklady ovlivnění analytů	Doporučení
Stres	glukóza, STH, prolaktin, kortizol, koagulační faktory, objem ery, množství ery	odběr po relaxaci
Předchozí dieta	glukóza, TAG, močovina, fosfáty, ALP, močovina, kys. močová	lačnění před odběrem 12 hodin
Prodloužené lačnění	koagulační faktory, oGTT, bilirubin	3 dny před odběrem normální přísun potravy
Poloha pacienta při náběru	bílkoviny, lipidy, enzymy, Hb, počet ery, objem ery, aldosteron	před odběrem 15 minut v klidu

Biorytmy	železo, glukóza, kortizol, sodík v moči, kalium v krvi, oGTT, kortizol ranní odpolední	odběr vzorků mezi 7 - 9 hod. ranní
Svalová aktivita	CK, LD, draslík, láktát, glukóza, koagulační faktory počet ery, objem ery,	3 dny před náběrem žádná vyčerpávající fyzická námaha
Alkohol	glukóza, kys.močová, AMS	před náběrem nepožívat alkoholické nápoje
Kouření	lipáza, AMS, cholesterol, glukóza, oGTT, CoHb, amoniak	před náběrem omezit kouření
Léky	většina analytů	pokud lze - před odběrem vynechat, příp. uvést na žádanku

Bezpečnostní aspekty

1. Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční. Je nutné zabránit zbytečným manipulacím s krví, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky odebírající osoby, veškerých zařízení používaných při odběru nebo ke vzniku infekčního aerosolu.
2. U nemocných s poruchami vědomí nebo u malých dětí je nutné očekávat nenadálé pohyby nebo nečekané reakce na vpich a zabránit tak poranění.
3. Pacienti, kteří jsou odesláni k odběru do laboratoře a mají nějaké závažné infekční onemocnění – žloutenka, HIV, TBC, by měli mít tuto skutečnost vyznačenu na žádance, případně personál laboratoře by měl být předem informován telefonicky.
4. Veškeré manipulace s odběrovými jehlami se musí provádět s maximální opatrností. Použitých jehel se zásadně nedotýkat a k likvidaci používat speciálních kontejnerů na odstranění jehly ze stříkačky. K uskladnění použitých jehel před jejich likvidací se používají pevné obaly, aby nedošlo k náhodnému propíchnutí a event. poranění.
5. Veškerý **materiál**, který byl kontaminován krví a je určen k likvidaci, je nutné ukládat do speciálně označených odpadních nádob pro biologický odpad.

Zbytková rizika

Zbytková rizika v laboratoři představují nebezpečí a potenciální zdroje chyb, které přetrvávají i přes zavedení všech preventivních opatření, bezpečnostních protokolů a kontrolních mechanismů (podle normy ISO 15189). Laboratoř si je vědoma, že nelze dosáhnout 100% bezpečnosti a spolehlivosti, a proto tato rizika identifikuje a minimalizuje jejich dopad na pacienty a personál. Tato minimalizovaná – zbytková rizika jsou na vyžádání v laboratoři.

Smluvní laboratoře – nabízené služby

Laboratoř využívá pro řadu vyšetření smluvní laboratoř – EUC Laboratoře s.r.o. **Aktuální nabídka** služeb EUC Laboratoří je uvedena na www.euclaboratore.cz

1. menu „Pro Lékaře“ Laboratorní příručka – (F1) Seznam vyšetření
2. menu „Pro Lékaře“ Laboratorní příručka – seznam přeposílaných vyšetření
3. menu „Pro pacienty“ nabídka služeb pro samoplátce, které mohou případní zájemci požadovat.

EUC Laboratoře nabízí tato vyšetření:**Vyšetření v séru a plazmě**

vazebná kapacita Fe, ferritin, transferrin, amyláza pankreatická, lipáza, cholinesteráza, LD, homocystein, C-peptid, anti GAD, anti IA2, antiIAA, RF, ASLO, kys. listová, vitamin B12, vitamin D

Hematologie

krevní skupina, RH faktor, protilátky screen. těh.,

Vyšetření v moči

Těhotenský test (HCG)

Sbíraná moč

Na, K, Cl, P, Mg, urea kreatinin, kys. močová, bílkovina, clearance kreatininu

Vyšetření ve stolici

OK test, Helicobacter pylorii Ag, calprotectin

Screening drogy

Kokain, Morfin/Heroin, Metamfetamin, MDMA (Extáze), PCP (anděl.prach), Amfetamin, Marihuana/THC, Benzodiazepin

Imunoglobuliny

C3, C4, IgA, IgM, IgG, IgE celkové, IgE podtřídy, ECP, prokalcitonin, Manan.vaz.prot., CIK PEG, A1AT, orosomukoid, ceruloplasmin

Endokrinologie

HCG, FSH, LH, estradiol, progesteron, prolaktin, DHEAS, testosteron, SHBG, kortizol, fT3, T3, T4, anti TG, anti TPO

Tumorové markery

AFP, CEA, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, CA72-4, CYFRA 21-1, NSE, $\beta 2$ mikroglobulin, protein S100 β , TG (thyreoglobulin), SCC

Markery hepatitid

HBsAg, anti HBs, HBeAg, anti HBe, HBeAg, anti HBc IgM, anti HBc total, anti HAV IgM, anti HAV total, anti HAV IgM, anti HCV, anti HEV, HBV PCR kvantita, HBV PCR genotyp, HCV PCR kvantita, HCV PCR genotyp

Specifické protilátky

HIV (Ag/Ab HIV 1, 2), BWR (RPR, TPHA), EBV (VCA, EBNA, EA), WB EBV, infekční mononukleóza, CMV, HSV-1,2, VZV, RF třídy (IgG, IgA, IgM), anti CCP, Tetanus, Rubella, Toxoplasma gondii, Borrelia (burgdorferi sensu lato), WB Borrelia, klíšťová encefalitida, Helicobacter pylori, WB Helicobacter pylori, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia

(LPS, pneumoniae, trachomatis), WB Chlamydia, WB Bordetella pertussis/parapertussis, Bordetellapertussis toxin, WB Yersinia, WB Campylobacter, Morbili, RSV, noroviry, adenoviry, parvoviry, Covid 19

Kontrola očkování

Klíšťová encefalitida, tetanus, zarděnky, spalničky

Autoprotilátky

ANA (IgG, IgA, IgM), ANA IF, ENA screen, ANA blot, dsDNA, nukleosomy, histony, ASCA, Gastro blot, GBM blot, ANCA IF, ANCA profil, Endomysium, AMA, ASMA, LKM, GPCA, jaterní blot

Revmatologická vyšetření

Revmatoidní faktor (IgG, IgA, IgM), anti citrulin (CCP2)

Dermatologický blok

Anti BM epidermis, anti desmozomy

Neurologický blok

Anti MAG, anti IA2

Trombofilní mutace

FV Leiden, MTHFR AC, MTHFR CT, FII, Protrombin

Potravinová intolerance

Anti gliadin, DA, anti endomysium, IgA, IgG, anti tTG, anti retikulin, ASCA, anti kravské mléko, anti laktóza. anti soja

Buněčná imunita

CD3, CD4, CD8, CD19, NK, DR, CD4/CD45RA, CD4/CD45RO, HLA B27, CD3-/CD57+, fagocytóza

Alergologická vyšetření

specifické IgE proti směsím alergenů i jednotlivým nativním i rekombinantním alergenům, ECP
slgE směsi alergenů

Virové hepatitidy

HCV (genotyp, kvantifikace, genotypizace), HBV (genotyp, kvantita, precore mutanta, rezistence na lamivudin), HDV, HEV, HGV

Mykobakteria

Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. africanum, M.bovis,M. bovis BCG ,M.microti, M. pinnipedii), Mycobacterium diff. (M. tuberculosis complex + M. avium complex)

Urogenitální infekce

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, HPV (typ 16,18), Treponema pallidum, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, E. coli, Pseudomonas sp., Enterococcus faecalis

Herpetické viry

Cytomegalovirus (+ kvantita), EB virus (+ kvantita), HSV 1,2, HHV 6,8, Varicella zoster

Respirační infekce

Legionella species, Legionella pneumoniae, Adenovirus subgenera, Aspergillus species, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Influenza virus

A,B, Parainfluenza virus 1,2,3, RSV,Rhinovirus, Polyomaviry JC a BK, SARS, Pneumocystis jiroveci, Klebsiella pneumoniae, Metapneumovirus, Moraxella catarrhalis, Adenovirus, Nocardia asteroides, Coxiella burnetii, ECHO viry

Onemocnění CNS

Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Listeria monocytogenes, Streptococcus pneumoniae, Borrelia burgdorferi, Flavivirus, Coxsackie virus, N. meningitidis Meningococcus, Toxoplasma gondii, VZV, Mumps virus, Rubeola virus, Balamuthia, Acanthamoeba

Gastroenteritidy

Norovirus, Adenovirus (40,41), Astrovirus, Enterovirus typ 68-71, Helicobacter pylori, Rotavirus, Astrovirus, Coronaviry, E.coli, Staphylococcus aureus

Mykotické infekce

Univer. průkaz patogenních hub, Nocardia, Candida albicans, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida glabrata, Aspergillus species, Cryptococcus neoformans

Ostatní

Bartonella species, Corynebacterium diphtheriae, Ehrlichia, Burkholderia cepacea, Histoplasma capsulatum, Yersinia pestis

Kultivační vyšetření výtěrů z HCD, sputa, vyšetření infekcí GIT a urogenitálního traktu, kultivační vyšetření jiných klinických materiálů, mykologická vyšetření a průkaz antigenů některých bakteriálních a virových agens.

Zpracování histologických vzorků, molekulárně genetická vyšetření – Laboratoře CGB Ostrava.

Pro molekulárně genetická vyšetření je nutné k žádance přiložit „Souhlas vyšetřovaného s molekulárně-genetickým laboratorním vyšetřením“. Svoz je zajištěn denně.

Vzhledem k neustále rostoucímu spektru vyšetření je vhodné pro jejich vyhledávání používat uvedené webové stránky (viz výše).

Další smluvní laboratoři je Interimun (imunologická laboratoř).

Použité zkratky

ACR	poměr albuminu v moči a kreatininu v moči
ALP	alkalická fosfatáza
ALT	alaninaminotransferáza
AMS	amyláza
APTT	aktivovaný parciální tromboplastinový čas
AST	aspartátaminotransferáza
CK	kreatinkináza
CRP	C-reaktivní protein
DM	diabetes mellitus
EHK	externí hodnocení kvality
fPSA	prostatická antigen volná frakce
fT4	free T4 – tyroxin volný
FW	sedimentace erytrocytů

GGT	gamaglutamyltransferáza
HCD	horní cesty dýchací
HIV	Human immunodeficiency virus
INR	International standardized ratio-mezinárodní standardizovaný index
K3EDTA	sůl kyseliny etylendiaminotetraoctové (antikoagulans)
LIS	laboratorní informační systém
LKB	laboratoř klinické biochemie
MAU	albumin v moči (mikroalbumin)
OGTT	orální glukózový toleranční test
OM	odběrové místo
PSA	prostatický antigen celkový
SEKK	Systém externí kontroly kvality
TSH	tyreotropin
T, M, R	týden, měsíc, rok